

26.10.2015

## Фумагрі® НА

порошок для дезінфекції димоутворюючий (димова шашка)  
листівка-вкладка

### Опис

Дрібний порошок біло-бежевого кольору, розсипчастий, борошноподібний, що має злегка йдкий, не різкий запах.

Препарат представлений у металевих банках, готових до використання, що містять цей порошок, а також запалювальний елемент (гніт з натуральної бавовни).

### Склад

1 кг препарату містить діючу речовину:

гідроксиоцтову кислоту 4%.

Допоміжні речовини: амонію нітрат, кальцію карбонат, целюлоза, кремнію діоксид аморфний, вода.

### Фармакологічні властивості

Дезінфікуючий засіб має активну протимікробну дію по відношенню до грамнегативної та грампозитивної мікрофлори, окрім спорульованих форм (*Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Proteus vulgaris (hauseri)*, *Campylobacter*, *Listeria monocytogenes* та інші), фунгіцидну дію (*Aspergillus niger*, *Candida albicans*, *Candida pelliculosa*, *Absidia*, *Aspergillus versicolor*, *Eurotium repens*, *Penicillium candidum*, *Aspergillus fumigatus*, *Cladosporium cladosporoïdes* та інші).

### Застосування

Препарат застосовується для профілактичної та вимушеної дезінфекції закритих тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаційних яєць (на складах яєць батьківських господарств та в залах прийому на інкубаторі), інкубаторів (інкубаційних і вивідних шаф, приміщень для сортування і вакцинації), транспортних засобів для перевезення добових курчат, кормовиробничих, складських приміщень (на заводах та фермах) для зберігання кормів, а також транспортних цистерн для перевезення кормів.

### Дозування

Для проведення дезінфекції використовують 0.8 г препарату на 1м<sup>3</sup>. Кількість доз залежить від об'єму, що потребує обробки. Оптимальна вологість для застосування препарату: 50-100%. Перед активацією слід перекрити подачу газу, вимкнути усі детектори диму, закрити усі виходи з приміщення, вимкнути вентиляцію і перевернути кожну димову шашку декілька разів перед відкриттям. Активація димових шашок відбувається по одній, починаючи із самої віддаленої від виходу з приміщення. Для активації розмістити димові шашки на тепlostійких підставках на підлозі, розподілити по приміщенню, запалити гніт, утримуючи контакт з вогнем протягом 8 секунд. Покинути приміщення, увімкнути сповіщення про проведення аерозольної дезінфекції. Тримати приміщення засиненим протягом 15 годин. Після відкриття приміщення потрібно провести провітрювання або вентилювання протягом 1 години.

На заводах по виробництву кормів проводять профілактичну або вимушенну дезінфекцію (наприклад, при виявленні сальмонели) після зупинки процесу виробництва.

Складські приміщення (на заводах та фермах) для зберігання кормів, а також транспортні цистерни для перевезення кормів потребують регулярну дезінфекцію: профілактичну при кожному розвантаженні з метою зупинки розвитку патогенної плісняви або вимушенну у випадку виявлення сальмонели. Транспортні цистерни для перевезення кормів можуть проходити дезінфекцію під час транспортування, якщо вони містять спеціальні контейнери для утримання димових шашок.

Інкубаційні яйця проходять у перший раз дезінфекцію теплими - на складах зібраних яєць на батьківських фермах, а другий раз охолодженими - у залах приймання на інкубатор. Дезінфекція теплих яєць має на меті зупинення проникнення ембріопатогенних бактерій всередину яєць, а дезінфекція холодних яєць у інкубаторі має на меті уникнення заражень, що можуть потрапити через яйця до інкубатору.

В інкубаторах профілактична дезінфекція проводиться в інкубаційних і вивідних шафах перед завантаженням яєць, а також у приміщеннях для сортування і вакцинації. Пряма дезінфекція інкубаційних яєць препаратом Фумагрі® НА не має впливу на їх вивідність.

Транспортні засоби для перевезення добових курчат також проходять регулярну дезінфекцію після мийки за умови, що автомобілі є закритими, що дозволяє проводити повітряну дезінфекцію.

У пташниках дезінфекцію препаратом проводять як другу дезінфекцію у кінці санітарної обробки, після настилання нової підстилки, за 24-48 годин до запуску нової партії. У холодний період перед дезінфекцією пташники нагріваються до температури 15-20°C.

На свинокомплексах (маточники та приміщення для відгодівлі) дезінфекцію проводять при кожній санітарній обробці, після мийки. При цьому необхідно, щоб приміщення у свинокомплексі були відгороджені, щоб мати можливість проведення дезінфекції у кожному окремому приміщенні.

### **Протипоказання**

Препарат не призначений для застосування за присутності тварин і птиці, а також не використовується для профілактичної та вимушені дезінфекції кормів.

### **Застереження**

Дезінфекцію проводять за відсутності тварин і кормів, у повністю закритому приміщенні із сигнальною вивіскою про проведення дезінфекції при вході до приміщення, при вимкненій вентиляції. Впевнитися у відсутності вибухової атмосфери у приміщенні (газ, займистий пил у концентраціях, що перевищують нижню границю вибуховості), видалити усі горючі та теплочутливі матеріали на відстань 1.50 метрів від кожної димової шашки. Застосування препарату повинно відбуватися подалі від будь-яких горючих матеріалів і у невибуховому середовищі (забороняється застосування препарату у середовищі, наповненому займистим газом або органічним пилом). Препарат постачається у вигляді димових шашок, готових до використання, від не вимагає жодної маніпуляції або пересипання, тому димові шашки повинні використовуватися у незмінному стані і за один раз. Перед заняттям приміщення тваринами, потрібно провести натуральне провітрювання або механічну вентиляцію. Поновлення повітря на 90% гарантовано після 1 години з поверненням середовища у свій попередній стан.

### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Активація препарату не потребує наявності засобів індивідуального захисту. Тим не менш, рекомендується оператору надягати захисні рукавички і маску. Активація димових шашок повинна розпочинатися із самої віддаленої від виходу. Виділення диму відбувається у зростаючій прогресії кілька хвилин після активації димових шашок, що дозволяє оператору покинути приміщення до розповсюдження диму. У випадку вимушеного потрапляння у приміщення протягом дезінфекції, персонал повинен використовувати протигазовий респіратор з фільтром АВЕК2-Р3, а також захисний комбінезон і рукавички. Рекомендується не залишатися у приміщенні більше однієї хвилини.

Після закінчення виділення диму, димові шашки залишаються гарячими протягом приблизно 20 хвилин. Тому з метою уникнення опіків не рекомендується торкатися димових шашок до їхнього повного охолодження, або тільки у термічних рукавичках.

### **Форма випуску**

Залізні банки із запаяною кришкою, що легко відкриваються місткістю 16 г, 40 г, 80 г, 200 г, 400 г, 1000 г; алюмінієві банки із стандартною пластиковою кришкою місткістю 20 г.

### **Зберігання**

Зберігати в закритій тарі виробника при температурі від 15°C до 25°C, у сухому, добре вентильованому приміщенні, подалі від займистих і горючих матеріалів, а також від кормів і харчових продуктів. Препарат може витримувати низькі і високі температури (до 35°C-40°C) протягом декількох днів, наприклад під час перевезення.

Термін придатності препарату у непошкодженному упакуванні – 24 місяці.

Після відкриття димова шашка повинна бути використана негайно і за один раз, без пересипання в іншу тару (після відкриття гігроскопічний порошок може швидко набратися вологи і нормально не активуватись).

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення**

ЛСБ С.А.С

АКТІПАРК – 01190 БОЗ

Франція

Тел.: +33 3 85 36 81 00

Факс: +33 3 85 36 01 28

E-mail: patrick.arnould@lcbfoodsafety.com

**Виробник готового продукту**

ЛСБ С.А.С

АКТІПАРК – 01190 БОЗ

Франція

Тел.: +33 3 85 36 81 00

Факс: +33 3 85 36 01 28

E-mail: patrick.arnould@lcbfoodsafety.com