

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Авігард[®], Aviguard[®].

Склад

Препарат містить активні діючі компоненти:

- суміш культур бактерій-коменсалів мікрофлори сліпої кишки SPF-курчат, зокрема, представників родів *Bacteroides*, *Citrobacter*, *Clostridia*, *Escherichia*, *Enterococcus*, *Eubacteria*, *Fusobacteria*, *Lactobacillus*, *Propionibacteria*, *Ruminococcus* та *Streptococcus* spp. Вміст живих бактерій складає не менше 10⁹ клітин/1г пробіотика.

Допоміжні речовини: мальтодекстрин.

Фармацевтична форма

Порошок-ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Препарат забезпечує швидке формування нормальної бактеріальної флори шлунково-кишкового тракту у молодняка, а також відновлення нормальної мікрофлори кишечника птиці після обробки протимікробними препаратами.

Вид тварин

Кури, індики, фазани і декоративна птиця.

Показання до застосування

Застосовують у якості антагоніста патогенних опортуністичних мікроорганізмів *Salmonella*, *Escherichia coli* та *Clostridium perfringens*, з метою профілактики симптомів захворювань системи органів травлення птиці, спричинених зазначеними збудниками.

Протипоказання

Протипоказання.

Застереження при застосуванні

Немає.

Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з іншими препаратами.

Особливі вказівки при несучості

Препарат може застосовуватися під час несучості.

Спосіб застосування та дози

Препарат вводять спреєм-методом, методом випоювання або перорально через зонд.

Перед застосуванням порошок розчиняють у чистій питній воді без домішок заліза та хлору.

Спрей-метод

Застосовують курчатам 1-денного віку одразу після виводу. Для розпилювання використовують спеціальні генератори, які забезпечують утворення крупнокрапельного спрею. Розпилювач повинен бути корозійностійким і не містити залишків дезінфектантів.

Розчиняють увесь вміст пакета із розрахунку: пакет 25 г на 2000 голів птиці - в 500 мл води; пакет 62,5 г на 5000 голів – у 1,25 л води; пакет 125 г на 10000 голів – у 2,5 л води. Для розпилювання на 1000 голів використовують 250 мл отриманої рідини.

Метод випоювання

Пакет відкривають та розчиняють увесь його вміст безпосередньо перед застосуванням.


Застосовують молодняку на вирощуванні та дорослій птиці (в тому числі, після обробки протимікробними речовинами). Розчиняють увесь вміст пакета у відповідному об'ємі чистої питної води без домішок заліза та хлору, який птиця споживає протягом 4-8 годин.

Побічні ефекти

Немає.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.



Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00802-02-16
від 18.07.2016

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВПІ

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. Максимально уникати потрапляння препарату в очі, на шкіру та одяг, використовувати індивідуальні засоби захисту – окуляри, маску, гумові рукавиці та халат. Не їсти, не пити і не палити під час і після обробки птиці. Мити і дезінфікувати руки і обладнання після обробки.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПІ, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат утилізують згідно чинного законодавства.

Термін придатності

18 місяців. Після розчинення використати увесь вміст одразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці. Зберігати окремо від харчових продуктів та кормів для тварин.

Упаковка

Саше з ламінованої поліестер-алюмінієвої фольги по 2000 (25 г), 5000 (62,5 г) і 10000 доз (125 г) із розрахунку обробки 2000, 5000 і 10000 голів птиці відповідно. Саше упаковані в марковані коробки та зовнішні картонні коробки для транспортування.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Лаллеманд Енімал Нутрішн ЮК, ЛТД, Спрінг Лейн Норз, Мелверн лінк, Уорчестер, WR14 1BU, Великобританія.

Правила відпуску

Без рецепту.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.