



Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00171-02-10
від 07.04.2015

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® Гамборо D78, Nobilis® Gumboro D78 – вакцина жива ліофілізована проти інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо).

Склад

Кожна доза містить живий вірус бурсальної хвороби, штам D78 $\geq 4,0 \log_{10}$ TCID₅₀.
Вакцина також містить стабілізатор і гентаміцин.

Фармацевтична форма

Вакцина – ліофілізат.

Імунообіологічні властивості

Активний імунітет настає через 7 днів і зберігається впродовж всього періоду сприйнятливості птиці до хвороби Гамборо.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Активна імунізація курчат проти інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо).

Протипоказання

Немає.

Застереження при застосуванні

Вакцинувати лише здорову птицю. Мити та дезінфікувати руки та обладнання після вакцинації.
Кожен флакон повинен бути використаний одразу після відкриття.

Взаємодія з іншими засобами

Не рекомендовано застосовувати будь-які інші препарати одночасно з вакциною.

Особливі вказівки при несучості

Немає.

Спосіб застосування та дози

Програма вакцинації:

Вакцинація проводиться між 8 та 28 днем життя птиці. Оптимальний термін та кількість вакцинацій залежить від рівня материнських антитіл. У випадку великої неоднорідності материнських антитіл необхідно вакцинувати птицю двічі з інтервалом у 1 неділю. За відсутності материнських антитіл або низькому їх рівні, птицю можна вакцинувати, починаючи з 1 добового віку аерозольним методом, або закапуванням у око/ніс.

Метод випоювання

Вакцину застосовують з питною водою у кількості, що відповідає віку птиці, яку вона повинна випити впродовж 2 годин.

Аерозольний метод

1000 доз вакцини розчинити в 1 л води. Розпилити розчин над птицею грубодисперсним спреєм з відстані 30-40 см.

Інтраокулярний/інTRANАЗальний метод

1000 доз розчинити у 30 мл фізіологічного розчину або у розчиннику Diluent Oculo Nasal і закрапувати за допомогою стандартної піпетки – одну краплю в око, одну в ніс.

Побічні ефекти

У здорової птиці системних клінічних реакцій на вакцинацію не спостерігається.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

Державний комітет ветеринарної медицини України
Державний науково-контрольний інститут
біотехнологій і штамів мікроорганізмів
Ідентифікаційний код 19024865
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00171-02-10
від 07.04.2015

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

Термін придатності

24 місяці. Після розчинення використати протягом 2 годин.

Умови зберігання і транспортування

В сухому темному місці недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, при температурі від 2 °C до 8 °C. Не заморожувати.

Упаковка

Флакони по 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 або 10000 доз вакцини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернейшнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Правила відпуску

Без рецепта. Застосовувати препарат може лише лікар та фельдшер ветеринарної медицини.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламиацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.