



Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00130-02-14
від 03.04.2014

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® ТРТ інак, Nobilis® TRT inac – вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту індиків та курей.

Склад

Одна доза (0,5 мл) містить:

інактивований вірус ринотрахеїту (TRT) штам BUT 1#8544 не менш ніж $\geq 10 \log_2$ ELISA одиниць.

Вакцина також містить 215 мг рідкого парафіну в якості ад'юванту.

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Нобіліс® ТРТ інак містить вірус ринотрахеїту (TRT) штам BUT 1#8544 інактивований β -пропіолактоном та суспендований у водній фазі водно-олійної ад'ювантої емульсії. Активні компоненти вакцини стимулюють імунітет проти інфекційного ринотрахеїту індиків та курей. Антигени вміщені в водно-олійну емульсію для подовження часу стимуляції імунної системи вакцинованої птиці.

Вид тварин

Кури та індики.

Показання до застосування

Для активної імунізації індиків та курей з метою зменшення смертності, клінічних проявів (включаючи зниження яйценосності) викликаних вірусом ринотрахеїту індиків та курей.

Протипоказання

Вакцинувати лише здорову птицю.

Застереження при застосуванні

Перед використанням нагріти вакцину до кімнатної температури (15+25) °C та добре струсити. Використовувати стерильне обладнання. Не використовувати обладнання із гумовими частинами, тому що речовини, які містяться у вакцині можуть вступати в реакцію із гумою та пошкоджувати її.

Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з іншими вакцинами і препаратами.

Особливі вказівки при несущості

Немає застережень.

Спосіб застосування та дози

Одну дозу (0,5 мл) вакцини вводять внутрішньом'язово в стегновий або грудний м'яз, або підшкірно в задню частину шиї. Індиків вакцинують на 28 тижні життя. Курей вакцинують на 14-20 тижні життя. Птицю вакцинують не пізніше ніж за 4 тижні перед початком періоду яйцепладки. Для кращого ефекту рекомендована попередня вакцинація живою вакциною Нобіліс® ТРТ (за 4 тижні до вакцинації Нобіліс® ТРТ інак).

Побічні ефекти

В деяких випадках можуть спостерігатися місцеві тканинні реакції – протягом 2-х тижнів після вакцинації може зберігатися невелике припухання у місці ін'єкції.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. Якщо працівник, який проводить вакцинацію, випадково ввів вакцину собі, або людині, що знаходилась поряд, то можлива місцева реакція у місці ін'єкції. У таких випадках необхідно звернутись до лікаря, показавши йому листівку-вкладку.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

Термін придатності

24 місяці. Після відкриття використати протягом 3-х годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в темному місці при температурі від 2 °C до 8 °C. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

Упаковка

Флакони із поліетилену терафталату (PET) по 250 або 500 мл закриті гумовими пробками під алюмінієву обкатку, що містять 500 або 1000 доз вакцини.

Правила відпуску

Без рецепту. Застосовувати препарат може лише лікар або фельдшер ветеринарної медицини.

Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернейшнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникили ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламиацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.