



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 05.04.2017 № 1040-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 12.04.2017 р. № 258 зареєстровано:

препарат

НЕПОРЕКС™ 2 SG

форма

Водорозчинні гранули

Власник реєстраційного посвідчення:

Еланко Європе Лімітед

Ліллі Хаус, Прістлі Роуд, Бесінгсток, Гемпшир, РГ24 9НЛ, Великобританія

зареєстровано в Україні за №

АА-03196-01-12

від

12.04.2017

Виробник:

Ширм АГ

Дивізіон Сифокан, Дизельштрассе 8, D-85107, Бар-Ебенхаузен, Німеччина

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2)
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

11.04.2022

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок

Національне агентство ветеринарних
препаратів та кормових добавок

79019, м. Львів, вул. Донецька, 11
Тел.: (032) 252-82-84; факс: (032) 252-11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail: NAVPFA@ukr.net



MINISTRY OF AGRICULTURAL POLICY
AND FOOD OF UKRAINE

State scientific-research control institute
of veterinary medicinal products
and feed additives

National agency of veterinary medicinal
Products and feed additives

Donetska str., 11, Lviv 79019, Ukraine
tel.: (380 32) 252-82-84; fax: (380 32) 252-11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail: NAVPFA@ukr.net

05.04.2017 № 1040-K/06

Директору Департаменту безпеки
харчових продуктів та ветеринарії
Держпродспоживслужби України
Кобалю Б.І.

Представництво «Елі ліллі Восток СА»,
Україна за дорученням фірми
Еланко Європе Лімітед (Великобританія)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє та
аналітичних випробувань препарату
НЕПОРЕКС™ 2 SG
власник Еланко Європе Лімітед (Великобританія)
виробник Ширм АГ (Німеччина)
згідно з контрактом № 540 від 22.12.2016 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та
аналітичних випробувань препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG, водорозчинні гранули, власник
Еланко Європе Лімітед (Великобританія), виробник Ширм АГ (Німеччина)
рекомендовано його перереєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АА-03196-01-12

Директор Інституту,
д.в.н., професор,
академік НААН

І.Я. Коцюмбас

Голова Агентства, д.б.н.

Ю.М. Косенко

Коротка характеристика препарату

1. Назва

НЕПОРЕКС™ 2 SG

2. Склад

100 г препарату містить діючу речовину:

циромазин – 2 г.

Допоміжні речовини: поліетиленгліколь, вода, сечовина.

3. Фармацевтична форма

Водорозчинні гранули

4. Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53GX, різні репеленти)

НЕПОРЕКС™ 2 SG – інсектицидний препарат, діючою речовиною якого є циромазин (2-циклопропіламіно-4,6-діаміно-*s*-триазину), ефективний проти личинок двокрилих комах *Musca spp.*, *Drosophila spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Lucilia spp.* у гної та інших місцях розмноження мух.

Циромазин є регулятором росту личинок мух та інших комах, впливає на метаболізм хітину у період линьки личинок. Циромазин в організмі личинок гальмує розвиток кутикули, внаслідок чого припиняється ріст личинок, які розвиваються у вологому середовищі (у гної, посліді, ферментуючих залишках кормів тощо), що призводить до їх загибелі.

Циромазин діє на личинки комах лише на певній стадії розвитку. У рекомендованих концентраціях він є найбільш ефективним на стадії першої линьки личинок двокрилих комах та має значно слабшу дію на інших стадіях розвитку личинок. Крім того, його дія обмежується на личинки двокрилих комах і не розповсюджується на інші комахи, які розмножуються у тому ж середовищі.

Циромазин перериває цикл розвитку мух у період линьки від I-ої до II-ої стадії. Рекомендується раннє застосування препарату так, як личинки II-ої та III-ої стадії, незважаючи на обробку, продовжують розвиватися, що в відтерміновує видимий ефект препарату.

Залежно від часу обробки, вплив препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG на чисельність популяції дорослих мух стає помітним через 1-2 тижні після застосування препарату. Для знищення популяції дорослих мух рекомендується одночасно застосовувати інсектициди проти дорослих комах.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Безпосередньо не стосується.

5.2 Показання до застосування

НЕПОРЕКС™ 2 SG застосовують для обробки тваринницьких приміщень (корівники, свинарники, пташники) для знищення личинок двокрилих комах: *Musca spp.*, *Drosophila spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Lucilia spp.*

5.3 Протипоказання

Немає.

5.4 Побічна дія

Не виявлена.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

–

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG є водорозчинним порошком, який можна застосовувати у сухому виді, а також методом обприскування та поливу. Рекомендована доза становить 0,5 г активної речовини на м² площі, яка обробляється, що забезпечує 5 проміле (ppm) на 10 см

12.04.2017

середовища, в якому розмножуються мухи. Доза препарату не залежить від способу застосування.
Рекомендовані дози:

<i>Препарат</i>	<i>Спосіб застосування</i>	<i>Доза, г препарату; г препарату/л води</i>	<i>Площа застосування, м</i>
НЕПОРЕКС™ 2 SG	Розкидання у сухому виді	500	20
	Обприскування	500 / 5	20
	Полив	500 / 15	20

Перед застосуванням препарату визначаються місця розмноження мух. Усі встановлені місця необхідно обробляти одночасно. Зовнішні купи гною та відстійники складають потенційні місця розмноження мух і повинні бути обробленими.

Личинки мух також можуть знаходитися у вологих місцях навколо годівниць і поїлок, а також в інших місцях тваринницьких приміщень (стіни, підлоги, стовпи, стійки, підпорки тощо).

НЕПОРЕКС™ 2 SG не має ефективної дії щодо дорослих мух. Знищення популяції дорослих мух здійснюється поступово і стає помітним через 1-2- тижні після застосування препарату. Для швидкого зниження популяції дорослих мух рекомендується одночасно застосовувати спеціальні інсектициди проти дорослих комах.

Способи застосування

Розкидання у сухому виді: Рівномірно нанести визначену кількість препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG безпосередньо у місця розмноження мух. Застосовувати препарат у сухому виді лише на вологий чи мокрий гній.

Обприскування: Розчинити визначену кількість препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG у відповідному об'ємі води. Отриманий розчин нанести на місця розмноження мух за допомогою ранцевого обприскувача або іншого автоматичного обприскувача.

Полив: Розчинити визначену кількість препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG у відповідному об'ємі води. Рівномірно нанести розчин у місця розмноження мух за допомогою поливної лійки.

Увага: НЕПОРЕКС™ 2 SG наносять безпосередньо у місця розмноження мух. Препарат неефективний проти дорослих комах, і тому не призначений для нанесення на місця посадки мух (стіни, стеля тощо).

Періодичність застосування: Періодичність застосування залежить від систем догляду та утримання тварин у приміщенні, а також від кліматичних умов. Рекомендована періодичність становить від 2 - 3 тижнів до декількох місяців.

Схеми застосування у різних тваринницьких приміщеннях

Корівник

Глибока підстилка: Нанести препарат смугою шириною приблизно 50 см вздовж стін, навколо обладнання та під ним, де підстилка не втрамбована тваринами; обробити краї годівниць і поїлок та місця, у які висипається з годівниць корм чи розливається з поїлок вода, а також місця нагромадження гною.

Зовнішні загони для телят: Нанести препарат на всю поверхню.

НЕПОРЕКС™ 2 SG застосовується методом обприскування або поливу приблизно через 3 доби після вичищення від гною та повторюється після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Загони із щілинною підлогою: Нанести препарат на всю поверхню підлоги відразу після вичищення від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Свинарник

Щілинна підлога: Нанести препарат на всю поверхню підлоги відразу після вичищення від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Система «пусто-зайнято»: Застосовувати препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG відразу після вичищення та перед запуском свиней.

Глибока підстилка: Застосовувати препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG шляхом обприскування чи поливу через 3 доби після вичищення від гною та після кожного наступного вичищення та при виявленні личинок мух. Обробляються повністю поверхні куп гною та вологі ділянки навколо годівниць та поїлок.

Пташник

Застосовувати препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG на всій поверхні куп гною приблизно через тиждень після вичищення пташників від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Інші сільськогосподарські об'єкти

Як правило, НЕПОРЕКС™ 2 SG застосовують у місцях розмноження мух через 1-3 доби після нагромадження матеріалу, який сприяє розмноженню комах. Наступна обробка проводиться через 2 тижні після першої.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Немає.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Не визначається.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з препаратом НЕПОРЕКС™ 2 SG необхідно дотримуватися загальних правил гігієни і безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Запобігати потраплянню препарату до годівниць та поїлок.

Уникати контакту тварин та птиці з препаратом.

Уникати прямого контакту препарату зі шкірою, слизовими оболонками та одягом.

Уникати попадання препарату в очі, у травний канал та органи дихання.

При роботі з препаратом користуватися захисним одягом та захисними рукавицями.

Не можна приймати їжу, пити, курити під час роботи з препаратом.

Після роботи необхідно ретельно вимити руки та передягнути одяг.

У випадку поганого самопочуття необхідно негайно припинити роботу з препаратом та звернутися до лікаря.

Специфічний антидот невідомий; рекомендують симптоматичне лікування.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

5 років.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати в оригінальному щільно закритому упакованні, у недоступному для дітей та тварин місці. Зберігати окремо від кормів, харчових продуктів та біодобавок. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Контейнери із поліетилену високої щільності по 5 кг.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний продукт повинен бути утилізований у відповідності з національними вимогами.

Не можна виливати залишки розчину у водойми або систему каналізації. Упакування та залишки препарату утилізуються у сміттєспалювальному устаткуванні сертифікованому для утилізації хімічних речовин. Якщо немає можливостей для безпечної утилізації необхідно зв'язатися з виробником, продавцем чи місцевим представником фірми.

12.04.2017

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Еланко Європе Лімітед (Великобританія)
Ліллі Хаус, Прістлі Роуд, Бесінгсток,
Гемпшир, РГ24 9НЛ

Elanco Europe Limited (United Kingdom)
Lilly House, Priestley Road, Basingstoke,
Hampshire, RG24 9NL

8. Назва і місце знаходження виробника

Ширм АГ (Німеччина)
Дивізіон Сифокан, Дизельштрассе 8,
D-85107, Бар-Ебенхаузен

Schirm AG, (Germany)
Division Sifokan, Dieselstrasse 8,
D-85107 Baar-Ebenhausen

9. Додаткова інформація

НЕПОРЕКС™ 2 SG
(водорозчинні гранули)
листівка–вкладка

Опис

Водорозчинні гранули.

Склад

100 г препарату містить діючу речовину:

циромазин – 2 г.

Допоміжні речовини: поліетиленгліколь, вода, сечовина.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53GX, різні репеленти)

НЕПОРЕКС™ 2 SG – інсектицидний препарат, діючою речовиною якого є циромазин (2-циклопропіламіно-4,6-діаміно-s-триазину), ефективний проти личинок двокрилих комах *Musca spp.*, *Drosophila spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Lucilia spp.* у гної та інших місцях розмноження мух.

Циромазин є регулятором росту личинок мух та інших комах, впливає на метаболізм хітину у період линьки личинок. Циромазин в організмі личинок гальмує розвиток кутикули, внаслідок чого припиняється ріст личинок, які розвиваються у вологому середовищі (у гної, посліді, ферментуючих залишках кормів тощо), що призводить до їх загибелі.

Циромазин діє на личинки комах лише на певній стадії розвитку. У рекомендованих концентраціях він є найбільш ефективним на стадії першої линьки личинок двокрилих комах та має значно слабшу дію на інших стадіях розвитку личинок. Крім того, його дія обмежується на личинки двокрилих комах і не розповсюджується на інші комахи, які розмножуються у тому ж середовищі.

Циромазин перериває цикл розвитку мух у період линьки від I-ої до II-ої стадії. Рекомендується раннє застосування препарату так, як личинки II-ої та III-ої стадії, незважаючи на обробку, продовжують розвиватися, що в відтермінує видимий ефект препарату.

Залежно від часу обробки, вплив препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG на чисельність популяції дорослих мух стає помітним через 1-2 тижні після застосування препарату. Для знищення популяції дорослих мух рекомендується одночасно застосовувати інсектициди проти дорослих комах.

Застосування

НЕПОРЕКС™ 2 SG застосовують для обробки тваринницьких приміщень (корівники, свинарники, пташники) для знищення личинок двокрилих комах: *Musca spp.*, *Drosophila spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Lucilia spp.*

Дозування

Препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG є водорозчинним порошком, який можна застосовувати у сухому виді, а також методом обприскування та поливу. Рекомендована доза становить 0,5 г активної речовини на м² площі, яка обробляється, що забезпечує 5 проміле (ppm) на 10 см середовища, в якому розмножуються мухи. Доза препарату не залежить від способу застосування.

Рекомендовані дози:

Препарат	Спосіб застосування	Доза, г препарату; г препарату/л води	Площа застосування, м ²
НЕПОРЕКС™ 2 SG	Розкидання у сухому виді	500	20
	Обприскування	500 / 5	20
	Полив	500 / 15	20

Перед застосуванням препарату визначаються місця розмноження мух. Усі встановлені місця необхідно обробляти одночасно. Зовнішні купи гною та відстійники складають потенційні місця розмноження мух і повинні бути обробленими.

Личинки мух також можуть знаходитися у вологих місцях навколо годівниць і поїлок, а також в інших місцях тваринницьких приміщень (стіни, підлоги, стовпи, стійки, підпорки тощо).

НЕПОРЕКС™ 2 SG не має ефективною дії щодо дорослих мух. Знищення популяцій дорослих мух здійснюється поступово і стає помітним через 1-2- тижні після застосування препарату. Для швидкого зниження популяції дорослих мух рекомендується одночасно застосовувати спеціальні інсектициди проти дорослих комах.

Способи застосування

Розкидання у сухому виді: Рівномірно нанести визначену кількість препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG безпосередньо у місця розмноження мух. Застосовувати препарат у сухому виді лише на вологий чи мокрий гній.

Обприскування: Розчинити визначену кількість препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG у відповідному об'ємі води. Отриманий розчин нанести на місця розмноження мух за допомогою ранцевого обприскувача або іншого автоматичного обприскувача.

Полив: Розчинити визначену кількість препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG у відповідному об'ємі води. Рівномірно нанести розчин у місця розмноження мух за допомогою поливної лійки.

Увага: НЕПОРЕКС™ 2 SG наносять безпосередньо у місця розмноження мух. Препарат неефективний проти дорослих комах, і тому не призначений для нанесення на місця посадки мух (стіни, стеля тощо).

Періодичність застосування: Періодичність застосування залежить від систем догляду та утримання тварин у приміщенні, а також від кліматичних умов. Рекомендована періодичність становить від 2 - 3 тижнів до декількох місяців.

Схеми застосування у різних тваринницьких приміщеннях

Корівник

Глибока підстилка: Нанести препарат смугою шириною приблизно 50 см вздовж стін, навколо обладнання та під ним, де підстилка не втрамбована тваринами; обробити краї годівниць і поїлок та місця, у які висипається з годівниць корм чи розливається з поїлок вода, а також місця нагромадження гною.

Зовнішні загони для телят: Нанести препарат на всю поверхню.

НЕПОРЕКС™ 2 SG застосовується методом обприскування або поливу приблизно через 3 доби після вичищення від гною та повторюється після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Загони із щілинною підлогою: Нанести препарат на всю поверхню підлоги відразу після вичищення від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Свинарник

Щілинна підлога: Нанести препарат на всю поверхню підлоги відразу після вичищення від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Система «пусто-зайнято»: Застосовувати препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG відразу після вичищення та перед запуском свиней.

Глибока підстилка: Застосовувати препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG шляхом обприскування чи поливу через 3 доби після вичищення від гною та після кожного наступного вичищення та при виявленні личинок мух. Обробляються повністю поверхні куп гною та вологі ділянки навколо годівниць та поїлок.

Пташник

Застосовувати препарат НЕПОРЕКС™ 2 SG на всій поверхні куп гною приблизно через тиждень після вичищення пташників від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Інші сільськогосподарські об'єкти

Як правило, НЕПОРЕКС™ 2 SG застосовують у місцях розмноження мух через 1-3 доби після нагромадження матеріалу, який сприяє розмноженню комах. Наступна обробка проводиться через 2 тижні після першої.

Протипоказання

Немає.

Застереження

При роботі з препаратом НЕПОРЕКС™ 2 SG необхідно дотримуватися загальних правил гігієни і безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Запобігати потраплянню препарату до годівниць та поїлок.

Уникати контакту тварин та птиці з препаратом.

Уникати прямого контакту препарату зі шкірою, слизовими оболонками та одягом.

Уникати попадання препарату в очі, у травний канал та органи дихання.

При роботі з препаратом користуватися захисним одягом та захисними рукавицями.

Не можна приймати їжу, пити, курити під час роботи з препаратом.

Після роботи необхідно ретельно вимити руки та передягнути одяг.

У випадку поганого самопочуття необхідно негайно припинити роботу з препаратом та звернутися до лікаря.

Специфічний антидот невідомий; рекомендують симптоматичне лікування.

Форма випуску

Контейнери із поліетилену високої щільності по 5 кг.

Зберігання

Зберігати в оригінальному щільно закритому упакуванні, у недоступному для дітей та тварин місці. Зберігати окремо від кормів, харчових продуктів та біодобавок. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Еланко Європе Лімітед (Великобританія)

Ліллі Хаус, Прістлі Роуд, Бесінгсток,

Гемпшир, RG24 9NL

Elanco Europe Limited (United Kingdom)

Lilly House, Priestley Road, Basingstoke,

Hampshire, RG24 9NL

Виробник готового продукту

Ширм АГ (Німеччина)

Дивізион Сифокан, Дизельштрассе 8,

D-85107, Бар-Ебенхаузен

Schirm AG, (Germany)

Division Sifokan, Dieselstrasse 8,

D-85107 Baar-Ebenhausen

5 кг

Elanco™



НЕПОРЕКС™

2 SG

водорозчинні гранули



Регулятор розвитку комах – для знищення личинок мух

СКЛАД

НЕПОРЕКС™ 2 SG – водорозчинні гранули, 1 кг препарату містить 20 г циромазину (2-циклопропіламіно-4,6-діаміно-5-тріазину).

МЕХАНІЗМ ДІЇ

НЕПОРЕКС™ 2 SG діє як регулятор розвитку комах і належить до групи похідних тріазину. Циромазин впливає на метаболізм хітину у комах. Оброблені циромазином личинки комах перестають линяти і не розвиваються до наступної стадії, таким чином зупиняється їх цикл розвитку. Перша стадія (льонька) розвитку личинки є найбільш чутливою до циромазину порівняно із другою і третьою стадіями. Препарат не діє на дорослих комах. Видимий ефект зменшення популяції дорослих мух настає приблизно через 2 тижні після застосування препарату. Для прискорення знищення мух рекомендується синхронно застосовувати інсектициди проти дорослих мух.

ЗАСТОСУВАННЯ

НЕПОРЕКС™ 2 SG застосовується для знищення личинок мух у тваринницьких приміщеннях та місцях загального користування.

ДОЗУВАННЯ

Доза активної речовини (циромазин) становить 0,5 г/м² гною (компост, добрива) або інші місця розмноження мух. Це відповідно становить: 25 г препарату НЕПОРЕКС™ 2 SG/м².

НЕПОРЕКС™ 2 SG - водорозчинні гранули, можна застосовувати у сухому виді, а також методом обприскування та поливу після розчинення у воді. Дві - три обробки із двотижневим інтервалом зазвичай є достатніми для повного контролю (знищення) популяції мух. Для повного знищення популяції дорослих мух рекомендується одночасно застосовувати інсектициди проти дорослих комах. Докладнішу інформацію дивитися у листівці-вкладці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПЕРША ДОПОМОГА

При роботі з препаратом НЕПОРЕКС™ 2 SG необхідно дотримуватися загальних правил гігієни і безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Запобігати потраплянню препарату до годівниці та поїлок.

Уникати контакту тварин та птиці з препаратом.

Уникати прямого контакту препарату зі шкірою, слизовими оболонками та одягом.

Уникати попадання препарату в очі, у травний канал та органи дихання. При роботі з препаратом користуватися захисним одягом та захисними рукавицями.

Не можна приймати їжу, пити, курити під час роботи з препаратом.

Після роботи необхідно ретельно вимити руки та передягнути одяг. У випадку поганого самопочуття необхідно негайно припинити роботу з препаратом та звернутися до лікаря.

АНТИДОТ

Специфічний антидот невідомий; рекомендується симптоматичне лікування.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальному щільно закритому упакованні, у недоступному для дітей та тварин місці. Зберігати окремо від кормів, харчових продуктів та біодобавок. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці.

Термін придатності - 5 років.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРЕПАРАТУ ТА УПАКУВАННЯ

Невикористаний продукт повинен бути утилізований у відповідності з національними вимогами.

Не можна виливати залишки розчину у водойми або систему каналізації. Упакування та залишки препарату утилізуються у сміттєспалювальному устаткуванні сертифікованому для утилізації хімічних речовин. Якщо немає можливостей для безпечної утилізації необхідно зв'язатися з виробником, продавцем чи місцевим представником фірми.

УПАКУВАННЯ

Контейнери із поліетилену високої щільності по 5 кг.

ВИРОБНИК

Ширм АГ, Дивізіон Сифокан,
Дизельштрассе 8,
D-85107, Бар-Ебенхаузен,
Німеччина

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Еланко Європе Лімітед, (Великобританія)
Ліллі Хаус, Прістлі Роуд,
Бесінгсток, Гемпшир, РГ24 9НЛ

Реєстраційне посвідчення №: АА-03196-01-12

Номер партії:

Дата виробництва:

Вжити до:



YL206060UEA 922739